

octenisept®
Vaginal-
therapeutikum



we protect lives
worldwide





Wie viele Frauen erkranken
mindestens einmal in ihrem Leben
an einer **vaginalen Dysbiose**?





octenisept® Vaginaltherapeutikum

3 von 4 Frauen^{1,2} erkranken mindestens einmal in ihrem Leben an einer vaginalen Dysbiose. 40 – 50 % aller vaginalen Dysbiosen sind bakterielle Vaginosen, 20 – 25 % sind Vulvovaginalcandidosen.³⁻⁶

Scheidenpilz		Bakterielle Vaginose	
Brennen		Brennen] ähnliche Symptome
Juckreiz		Juckreiz	
veränderter Ausfluss		veränderter Ausfluss	
Rötung		fischiger Geruch	



Vorteile, die überzeugen



Schnelle Linderung von Brennen, Jucken, Rötungen und Intimgeruch



Hilft auch bei **wiederkehrenden Infektionen** (z. B. nach Clotrimazol-Anwendung)



Auch zur Behandlung des **Partners** und in der **Schwangerschaft⁹** geeignet




Farblos – ohne unangenehme Wäschefflecken




Unterstützt die **Wiederherstellung** der natürlichen **Vaginalflora**

¹https://register.awmf.org/assets/guidelines/015-0281_52k_Bakterielle-Vaginose_2023-07.pdf ²<https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/015-072> ³Sobel JD, Subramanian C, Foxman B, Fairfax M, Gyax SE. Mixed vaginitis-more than coinfection and with therapeutic implications. Curr Infect Dis Rep. 2013;15(2):104-8. ⁴Poole DN, McClelland RS. Global epidemiology of Trichomonas vaginalis. Sex Transm Infect. 2013;89(6):418-22. ⁵Palmeira-de-Oliveira R, Palmeira-de-Oliveira A, Martinez-de-Oliveira J. New strategies for local treatment of vaginal infections. Adv Drug Deliv Rev. 2015;92:105-22. ⁶Holzer I. Gefahr der Frühgeburt durch Scheideninfektionen. Journal für Gynäkologische Endokrinologie/Österreich. 2019;29(4):151. ⁷S2k-Leitlinien der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) empfohlen für die Behandlung von: Vulvovaginalcandidosen (015-072 v. 01.09.2020) und der bakteriellen Vaginose (015-028 vom 01.06.2023) ⁸Candidosen ⁹ab dem 4. Monat


Einzigartige und einfache Anwendung



Sprühkappe entfernen, **Applikator aufsetzen**



Applikator tief in die Scheide einführen, 10 x sprühen, 7 Tage lang
Tag 1: morgens und abends
Tag 2–7: abends



Für den Mann:
mit aufgesetzter
Sprühkappe das Genital
vollständig benetzen



PZN: 00615641

Status	Apothekenpflichtiges Arzneimittel
Indikation/Einsatzgebiet	Zur Linderung der Symptomatik bei bakteriell oder durch Pilzinfektion (Candidosen) bedingtem Juckreiz, Brennen und Ausfluss im Vaginalbereich.
Wirkstoffe	1 mg/g Octenidinhydrochlorid 20 mg/g Phenoxyethanol
Produktvorteile	Schnelle Linderung der Symptome Hilft auch bei wiederkehrenden Infektionen (z. B. nach Clotrimazol Anwendung) Unterstützt die Wiederherstellung der Vaginalflora Zur Partnerbehandlung geeignet und für Schwangere ab dem 4. Monat
Anwendungshinweise ¹	Den Sprühapplikator in die Vagina einführen 10 Sprühstöße je Anwendung Sprühapplikator nach der Anwendung reinigen
Anwendungsdauer	7 Tage (oder gem. der Empfehlung des Arztes) am 1. Tag morgens und abends anwenden, an Folgetagen 1x täglich
Alter	Ab 18 Jahren

octenisept® Vaginaltherapeutikum • Wirkstoffe: Octenidindihydrochlorid, Phenoxyethanol (Ph. Eur.). **Zusammensetzung:** 100g Lösung enthalten: 0,1g Octenidindihydrochlorid, 2,0g Phenoxyethanol (Ph. Eur.). Sonstige Bestandteile: 2-[[3-Kokosfettsäureamidopropyl]dimethylazaniumyl]acetat, Natrium-D-gluconat, Glycerol 85%, Natriumchlorid, Natriumhydroxid, gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Antiseptikum zur Behandlung von Vaginalinfektionen. Linderung der Symptomatik bei bakteriell oder durch Pilzinfektion (Candidosen) bedingtem Juckreiz, Brennen und Ausfluss im Vaginalbereich. **Gegenanzeigen:** Allergie gegenüber den arzneilich wirksamen Bestandteilen oder einem der sonstigen Bestandteile. Für die Anwendung bei Kindern unter 8 Jahren liegen noch keine ausreichenden Erfahrungen vor. **Nebenwirkungen:** Als subjektives Symptom kann in seltenen Fällen ein vorübergehendes Brennen auftreten. Sehr selten sind kontaktallergische Reaktionen, wie z.B. eine vorübergehende Rötung an der behandelten Stelle möglich. **Warnhinweise:** octenisept® Vaginaltherapeutikum nicht in größeren Mengen verschlucken oder in den Blutkreislauf gelangen lassen. Stand 01/21 • Schülke & Mayr GmbH, D-22840 Norderstedt, Tel. +49 40 52100-666, info@schuelke.com

Auf [schuelke.com/Apothekenservice](https://www.schuelke.com/Apothekenservice) finden Sie weitere fachrelevante Produktinformationen, Schulungsvideos so wie Hygiene- und Desinfektionspläne und Downloads von Marketingmaterialien für Ihre Apotheke:



¹Weitere Hinweise siehe Packungsbeilage. ²S2k-Leitlinien der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) empfohlen für die Behandlung von: Vulvovaginalkandidosen (015-072 v. 01.09.2020) und der bakteriellen Vaginose (015-028 vom 01.06.2023)